

# Lubristil<sup>®</sup> INTENSE

HIALURONATO SÓDICO  
RETICULADO 0,4%



**Lubristil INTENSE** es una solución oftálmica estéril con pH fisiológico, basada en una tecnología patentada de reticulación del ácido hialurónico con urea (de manera que se forma una malla entre el ácido hialurónico y la urea). Esta reticulación hace que aumenten y mejoren las propiedades mecánicas específicas del ácido hialurónico, resistiendo a la degradación de las hialuronidasas mucho más tiempo que el ácido hialurónico natural, obteniendo así una acción lubricante e hidratante mayor y más prolongada.

La estructura hidratante en forma de malla del ácido hialurónico reticulado es capaz de suministrar agua durante un período prolongado al mismo tiempo que mejora las propiedades lubricantes del ácido hialurónico natural aumentando sus efectos humectantes, por ello está indicado como un adyuvante en el síndrome del ojo seco.

El ácido hialurónico reticulado proporciona al producto propiedades lubricantes, humectantes y reparadoras, capaces de aliviar la sequedad ocular debida al síndrome del ojo seco, irritación o fatiga ocular en caso de afecciones inflamatorias o factores ambientales, cirugía ocular o cirugía estética de párpados y blefaritis crónica.

La fórmula ha sido desarrollada para asegurar el máximo confort rápidamente tras su aplicación. Es adecuada para el uso diario, de día y de noche.

No contiene conservantes y / o moléculas con acciones antiinflamatorias y vasoconstrictoras.

**Lubristil INTENSE** es compatible con lentes de contacto.

**Indicaciones:** **Lubristil INTENSE** está indicado

- en el restablecimiento y la mejora de la estabilidad de la película lagrimal en el síndrome del ojo seco;
- después de cirugía refractiva;
- para el alivio de los ojos en casos de enrojecimiento, fatiga y malestar del ojo o de la mucosa ocular debido a:
  - factores ambientales (aire acondicionado, exposición excesiva a la radiación solar, viento, humo, contaminación, agua de mar o agua de la piscina y la salinidad);
  - sequedad de los ojos debido a la fatiga excesiva causada por el trabajo con ordenadores durante largos períodos, el estudio;
  - anomalías lagrimales debidas a inflamación, blefaritis crónica;
  - anomalías lagrimales debidas a cirugía ocular de naturaleza diversa o cirugía estética del párpado;
  - el uso de lentes de contacto blandas o semirígidas.

**Composición:** Solución acuosa de polímero reticulado de hialuronato sódico (de la cual el polímero reticulado de hialuronato sódico es el 0,4%), trometamol, ácido hidroclorehídrico 2N, cloruro de sodio, agua para inyectables. Sin conservantes.

**Instrucciones de uso:**

- Lave y seque sus manos cuidadosamente
- Separe un envase unidosis de la tira
- Gire y retire la tapa para romper el sello.
- Coloque la tapa teniendo cuidado de colocarla sobre una superficie limpia.
- Instilar 2 gotas en cada ojo presionando ligeramente el envase, a menos que le hayan prescrito otra cosa.
- Después del uso cierre inmediatamente el envase unidosis. La solución debe utilizarse en las siguientes 12 horas tras la primera apertura.

## Advertencias y precauciones:

- El producto está destinado únicamente al uso oftálmico.
- El producto es para uso individual.
- No utilizar el producto si el envase está deteriorado o no está perfectamente cerrado en el momento de la primera apertura.
- No usar si hay partículas visibles y/o cambios en el color de la solución.
- Durante la aplicación, evitar tocar el ojo y cualquier otra superficie con la punta del dispensador del envase.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en la etiqueta.
- En caso de efectos adversos durante el uso, interrumpir el tratamiento y consultar a un médico.
- No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la solución.
- No se han reportado interacciones con medicamentos u otras gotas para los ojos; sin embargo, deje al menos 15 minutos entre administraciones de otras gotas para los ojos.
- Deseche el producto de acuerdo con las normas locales de gestión de residuos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Consulte a su médico antes de usar este producto si está embarazada o es lactante.
- Para uso externo, no tragar.
- Es necesario informar de cualquier incidente grave ocurrido en relación con el producto sanitario al fabricante y a la Autoridad Competente del Estado miembro en el que esté establecido.

## Efectos adversos:

Inmediatamente después de la instilación, el producto puede causar una ligera visión borrosa temporal debido a la viscosidad de la solución. Por lo tanto, es recomendable esperar unos segundos antes de cualquier actividad que requiera una visión clara.

## Presentación:

30 unidosis de 0,5 ml con cierre.

## Condiciones de conservación:

Conservar entre 2°C y 30°C en lugar seco, lejos del calor y de la exposición directa a la luz solar. La solución debe utilizarse dentro de las 12 horas después de la apertura del envase.

## Caducidad:

Sin abrir: no exceder la fecha de caducidad indicada en la caja y en el envase unidosis.

**Fecha de la última revisión del texto:** 02.01.10/2022

CE 0051

MD

STERILE A

# DT/01/DT/010

AF-P/02

**C.O.C. Farmaceutici S.r.l.**

Via Modena, 15  
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) Italia

**ANGELINI PHARMA ESPAÑA, S.L.**  
c/ Antonio Machado, 78-80.  
3ª planta, módulo A-Edificio Australia  
08840 Viladecans, Barcelona (España)  
www.lubristil.es

 **Angelini  
Pharma**